

# Amêijoa-boia

*Ruditapes decussatus*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: fao.org

## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>1 026 toneladas/ano</b>	<b>13 toneladas/ano</b>	<b>16 toneladas/ano</b>
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

## Ecologia geral

Encontrada em baías abrigadas, estuários e lagoas. Tende a enterrar-se em areia, gravilha ou lodo, habitando locais menos profundos na costa. Alimenta-se de fitoplâncton e detritos.

Período de desova: 4 meses	Fecundidade absoluta mínima: 70 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,56	Fecundidade absoluta máxima: 420 000 ovos
Idade de maturação:	Taxa de crescimento populacional:
Longevidade: 7 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 11,7°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 48°	Nível trófico: 2,00

## Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: 30,2