

Amêijoa-branca

Spisula solida

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Muito baixa	Muito baixa
CENTRO	Muito baixa	Muito baixa
SUL	Muito baixa	Muito baixa



Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
402 toneladas/ano	30 toneladas/ano	421 toneladas/ano
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Esta espécie é encontrada entre zonas mais perto da costa até áreas mais profundas; Organismo que se enterra preferencialmente à superfície, em sedimento arenoso. Alimenta-se de partículas em suspensão. Nos diferentes locais da costa Portuguesa onde é explorado distribui-se principalmente entre 3 e 34 metros de profundidade.

Período de desova:	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K:	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação:	Duração da fase larvar planctónica: 26 dias
Longevidade:	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 3,9°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 33°	Nível trófico: 2,00

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: 10,0