

Amêijoa-japonesa

Ruditapes philippinarum

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
211 toneladas/ano	233 toneladas/ano	231 toneladas/ano
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Espécie presente em zonas entremarés e subtidal. Comum em áreas marinhas protegidas. Organismo com sífões pequenos, enterrando-se apenas até 10 cm de profundidade, numa diversidade de substratos: lodo, areia e gravilha. A sua dieta inclui: fitoplâncton, diatomáceas bentónicas, e matéria orgânica terrestre.

Período de desova: 4,5 meses	Fecundidade absoluta mínima: 432 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,45	Fecundidade absoluta máxima: 2 350 000 ovos
Idade de maturação: 1,5 anos	Taxa de crescimento populacional: 1,19
Longevidade: 14 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 13,4°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 67°	Nível trófico: 2,00

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: 10,0