

Ameijola

Callista chione

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987a)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
1,3 toneladas/ano	221,8 toneladas/ano	1,8 toneladas/ano
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0 %	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Alimenta-se ativamente de partículas em suspensão. Organismo pertencente à endofauna que habita substratos arenosos.

Período de desova:	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,17	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação:	Taxa de crescimento populacional:
Longevidade: 40 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 10,7°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 26°	Nível trófico: 2,00

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: 10,0