

Berbigão

Cerastoderma edule

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
892 toneladas/ano	141 toneladas/ano	96 toneladas/ano
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Encontrado em águas costeiras pouco profundas, na zona subtidal, e em áreas estuarinas. Habita em planícies arenosas. Podem também ser encontrados em substratos de areia lodosa da zona entremarés. É um organismo sésil e escavador, que se alimenta por filtração de partículas depositadas e em suspensão, bem como de microfítobentos e matéria orgânica particulada.

Período de desova:	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,58	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação:	Taxa de crescimento populacional: 0,49
Longevidade: 7 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 6,1°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 57°	Nível trófico: 2,00

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: 24,4