


Besugo

Pagellus acarne

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa



Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
244 toneladas/ano	145 toneladas/ano	404 toneladas/ano
Redes de arrasto: 63%	Redes de arrasto: 39%	Redes de arrasto: 38%
Redes de cerco: 2,3%	Redes de cerco: 36%	Redes de cerco: 12%
Pesca artesanal: 34,7%	Pesca artesanal: 25%	Pesca artesanal: 48%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Espécie demersal, que habita vários tipos de fundo, principalmente pradarias marinhas e areia, até aos 500 m de profundidade, sendo mais comum entre os 40 e 100 m; os juvenis estão presentes mais próximo da costa. É maioritariamente carnívoro, e as presas mais importantes na sua alimentação são: peixes, artrópodes, moluscos e equinodermes. É uma espécie hermafrodita do tipo protândricos (iniciando a sua vida como macho, convertendo-se em fêmea quando atinge comprimentos entre 17 e 29 cm, entre o seu segundo e sétimo anos de vida).

Período de desova: 5 meses	Fecundidade absoluta mínima: 19 500 ovos
Von Bertalanffy K: 0,27	Fecundidade absoluta máxima: 642 000 ovos
Idade de maturação: 1,5 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,63
Longevidade:	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 46°	Nível trófico: 3,74

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Sobre-explorado	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 43,0