

Boga-do-mar

Boops boops

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Muito baixa	Muito baixa
CENTRO	Muito baixa	Muito baixa
SUL	Muito baixa	Muito baixa



Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
148 toneladas/ano	107 toneladas/ano	214 toneladas/ano
Redes de arrasto: 17%	Redes de arrasto: 14%	Redes de arrasto: 21%
Redes de cerco: 71%	Redes de cerco: 54%	Redes de cerco: 50%
Pesca artesanal: 11%	Pesca artesanal: 32%	Pesca artesanal: 29%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

É um peixe pelágico encontrado na plataforma continental ou em fundos marinhos arenosos com lama, rochas ou ervas marinhas. Gregário, sobe à superfície principalmente à noite. A Boga é também omnívora, alimentando-se sobretudo de crustáceos, mas também de espécies planctívoras.

Período de desova: 3,5 meses	Fecundidade absoluta mínima: 395 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,24	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação: 1 ano	Taxa de crescimento populacional: 0,59
Longevidade: 5 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 16°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 79°	Nível trófico: 3,11

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Exploração sustentável	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 50,5