


Cabra-cabaço

Chelidonichthys lucerna

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa



Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
31 toneladas/ano	3 toneladas/ano	2 toneladas/ano
Redes de arrasto: 32%	Redes de arrasto: 16%	Redes de arrasto: 30%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 68%	Pesca artesanal: 84%	Pesca artesanal: 70%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Espécies bentónica que se alimenta-se de outros peixes e de organismos bentónicos; Tem uma longa época de reprodução.

Período de desova: 7 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,35	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação: 3,5 anos	Taxa de crescimento populacional:
Longevidade: 15 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 57°	Nível trófico: 3,58

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não identificado	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 39,5