

Cabra-de-bandeira

Chelidonichthys obscurus

| VULNERABILIDADE | RCP 4.5 | RCP 8.5 |
|-----------------|-------------|-------------|
| NORTE | Muito baixa | Muito baixa |
| CENTRO | Baixa | Baixa |
| SUL | Baixa | Baixa |




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987b)

Estatísticas da pesca em Portugal

| NORTE | CENTRO | SUL |
|-----------|-----------|-----------|
| Sem dados | Sem dados | Sem dados |

Em termos de capturas, as autoridades portuguesas não diferem entre as várias espécies de *Chelidonichthys*.

Ecologia geral

Organismos bentónicos que habitam na zona da plataforma continental em fundos com sedimentos macios e rochas caídas.

| | |
|--|---|
| Período de desova: | Fecundidade absoluta mínima: |
| Von Bertalanffy K: | Fecundidade absoluta máxima: |
| Idade de maturação: | Taxa de crescimento populacional: |
| Longevidade: | Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 5,5°C |
| Amplitude do intervalo de latitudes: 38° | Nível trófico: 3,44 |

Conservação

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Estado do estoque – ICES: | Vulnerabilidade – IUCN: |
| Desconhecido | Pouco preocupante |

Vulnerabilidade às pescas: 51,8