


Calafate-de-riscas

Umbrina cirrosa

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Moderada	Moderada
SUL	Moderada	Moderada



Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
0,02 toneladas/ano	0,02 toneladas/ano	0,49 toneladas/ano
Redes de arrasto: 25%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 2%
Pesca artesanal: 75%	Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 98%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

A Corvina é uma espécie de peixe demersal que pode ser encontrada em substratos rochosos ou arenosos em zonas costeiras, podendo indivíduos juvenis entrar em estuários. O seu período de reprodução tem início em maio e atinge o pico em junho. As suas presas incluem moluscos e anelídeos.

Período de desova: 6 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,63	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação: 3 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,99
Longevidade: 5 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 20°	Nível trófico: 3,41

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Exploração sustentável	Vulnerável

Vulnerabilidade às pescas: 40,4