

Carapau-negrão

Trachurus picturatus

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987b)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
625 toneladas/ano	173 toneladas/ano	603 toneladas/ano
Redes de arrasto: 50%	Redes de arrasto: 50%	Redes de arrasto: 58%
Redes de cerco: 44%	Redes de cerco: 40.5	Redes de cerco: 24%
Pesca artesanal: 6%	Pesca artesanal: 9.5%	Pesca artesanal: 18%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Espécie restringida à zona nerítica das plataformas insulares, bancos e montes submarinos; forma cardumes. Efetua migrações entre a costa do Saara e os montes submarinos em alto-mar, possivelmente chegando até às Ilhas de Cabo Verde. Alimenta-se principalmente de crustáceos.

Período de desova: 6 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,19	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação: 4 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,49
Longevidade: 18 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 86°	Nível trófico: 3,32

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 68,0