

Carocho

Centroscymnus coelolepis

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Moderada	Moderada
SUL	Moderada	Moderada




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987b)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
33 toneladas/ano	0,08 toneladas/ano	345 toneladas/ano
Pesca artesanal: 99,9%	Redes de arrasto: 16% Pesca artesanal: 84%	Pesca artesanal: 99,9%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Esta espécie está presente nas taludes continentais e planícies abissais; normalmente entre em águas com temperaturas entre os 5–13°C. Alimenta-se maioritariamente de peixes (incluindo tubarões) e cefalópodes, assim como de gastrópodes e cetáceos. Ovivíparos, gerando 13 a 29 ovos de cada vez. As crias nascem entre 27 e 31 cm. Existe copulação e fecundação interna.

Período de desova: 1 mês	Fecundidade absoluta mínima: 5 ovos
Von Bertalanffy K: 0,01	Fecundidade absoluta máxima: 30 ovos
Idade de maturação: 15 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,03
Longevidade: 60 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 136°	Nível trófico: 4,19

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Em perigo

Vulnerabilidade às pescas: 75,4