

Cavala

Scomber colias

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Moderada
SUL	Moderada	Moderada




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987b)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
5 090 toneladas/ano	1 925 toneladas/ano	6 634 toneladas/ano
Redes de arrasto: 7%	Redes de arrasto: 2%	Redes de arrasto: 3%
Redes de cerco: 80%	Redes de cerco: 66%	Redes de cerco: 70%
Pesca artesanal: 13%	Pesca artesanal: 32%	Pesca artesanal: 27%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Espécie pelágica que habita tanto águas superficiais como profundas; espécies planctívora -que se alimenta de plâncton; forma cardumes.

Período de desova: 2,4 meses	Fecundidade absoluta mínima: 18 450 ovos
Von Bertalanffy K: 0,31	Fecundidade absoluta máxima: 131 640 ovos
Idade de maturação: 2,5 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,60
Longevidade: 9 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 13,5°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 111°	Nível trófico: 3,91

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Sobre-explorado	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 43,1