

Choupa

Spondyliosoma cantharus

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa







Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
59 toneladas/ano	54 toneladas/ano	66 toneladas/ano
Redes de arrasto: 34%	Redes de arrasto: 7%	Redes de arrasto: 16%
Redes de cerco: 17%	Redes de cerco: 44%	Redes de cerco: 17%
Pesca artesanal: 49%	Pesca artesanal: 48%	Pesca artesanal: 66%
Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 

Ecologia geral

A choupa habita pradarias marinhas e fundos rochosos e arenosos, até cerca de 300 m de profundidade. Espécie gregária, que por vezes forma cardumes de grandes dimensões. Omnívora, alimentando-se de algas e pequenos invertebrados, especialmente crustáceos.

Período de desova: 3 meses	Fecundidade absoluta mínima: 37 500 ovos
Von Bertalanffy K: 0,24	Fecundidade absoluta máxima: 112 000 ovos
Idade de maturação: 2 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,47
Longevidade: 15 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: >10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 83°	Nível trófico: 3,27

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 37,2