

Congro

Conger conger

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Moderada	Alta
SUL	Moderada	Alta




Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
871 toneladas/ano	170 toneladas/ano	303 toneladas/ano
Redes de arrasto: 4%	Redes de arrasto: 2%	Redes de arrasto: 3%
Pesca artesanal: 96%	Pesca artesanal: 98%	Pesca artesanal: 97%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Conger conger é uma espécie demersal, distribuindo-se por um intervalo batimétrico amplo (0 a 1 200 m). Pode ser encontrado em fundos rochosos e arenosos. Juvenis mantêm-se próximos da costa e deslocam-se para águas mais profundas quando atingem maturidade sexual. É um predador noturno e alimenta-se de peixes, crustáceos e cefalópodes. O seu tamanho máximo é 300 cm (comprimento total). Similar a outras espécies do seu grupo taxonómico, o congro reproduz-se apenas uma vez no seu período de vida (semelparidade). Indivíduos atingem maturidade sexual entre as idades 5 a 15 anos. Desovam durante o verão, no oceano Atlântico (ao largo de Portugal) e no mar Mediterrâneo. Ovos são depositados em mar aberto, a profundidades entre 2 000–3 000 m.

Período de desova: 3 meses	Fecundidade absoluta mínima: 3 000 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,12	Fecundidade absoluta máxima: 8 000 000 ovos
Idade de maturação: 5 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,35
Longevidade: 9 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: ~10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 56°	Nível trófico: 4,26

Conservação

GRANDES DEMERSAIS

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 85,0