

Conquilha

Donax trunculus

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987a)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
0,21 toneladas/ano	33,5 toneladas/ano	256,8 toneladas/ano
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 1%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 99%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Habita sedimento fino e limpo. Espécie gonocórica. De todas as espécies comerciais de bivalves na costa Portuguesa a conquilha é a que apresenta uma menor distribuição em profundidade não indo além da batimétrica de 7 m e, normalmente, os maiores rendimentos verificam-se entre os 5-6 metros de profundidade.

Período de desova: 5 meses	Fecundidade absoluta mínima: 33 245 ovos
Von Bertalanffy K: 0,49	Fecundidade absoluta máxima: 641 000 ovos
Idade de maturação:	Taxa de crescimento populacional:
Longevidade:	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 9,2°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 49°	Nível trófico:

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Sobre-explorado	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: 20,0