


Corvinata-real

Cynoscion regalis

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Moderada	Moderada
SUL	Moderada	Moderada



Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
1,1 toneladas/ano	0,04 toneladas/ano	2,1 toneladas/ano
Pesca artesanal: 99%	Redes de arrasto: 14% Pesca artesanal: 86%	Redes de cerco: 4% Pesca artesanal: 96%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Normalmente ocorre em águas costeiras superficiais, em fundos arenosos e de lama arenosa. Os juvenis são eurialinos. Durante o verão, os peixes deslocam-se para as suas áreas de berçário e alimentação em rios estuarinos. Alimentam-se maioritariamente de crustáceos e peixes. Desovam diversas vezes, tendo várias épocas de acasalamento por ano ou poderão ter uma época de acasalamento prolongada.

Período de desova: 4,5 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,23	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação: 1 ano	Taxa de crescimento populacional:
Longevidade: 10 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: ~17°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 20°	Nível trófico: 4,01

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: 45,0