

# Ferreira

*Lithognathus mormyrus*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: fao.org

## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>1 toneladas/ano</b>	<b>3 toneladas/ano</b>	<b>101 toneladas/ano</b>
Redes de arrasto: 1%	Redes de arrasto: 1%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 39%	Redes de cerco: 39%	Redes de cerco: 51%
Pesca artesanal: 59%	Pesca artesanal: 59%	Pesca artesanal: 48%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

## Ecologia geral

A Ferreira está presente na plataforma continental; em fundos arenosos e lodosos, assim como em pradarias marinhas e estuários. Espécie gregária, formando por vezes cardumes de dimensões consideráveis. Alimenta-se de anelídeos, moluscos e pequenos crustáceos.

Período de desova: 4 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,22	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação: 2 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,70
Longevidade: 12 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: >10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 83°	Nível trófico: 3,42

## Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 40,4