


# Galhudo-malhado

*Squalus acanthias*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Alta	Alta
CENTRO	Alta	Alta
SUL	Alta	Alta



## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>2 toneladas/ano</b>	<b>0,7 toneladas/ano</b>	<b>2 toneladas/ano</b>
Redes de arrasto: 33%	Redes de arrasto: 2%	Redes de arrasto: 18%
Pesca artesanal: 67%	Pesca artesanal: 98%	Pesca artesanal: 82%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

## Ecologia geral

Tubarão comum em águas frias; geralmente a temperaturas de 6–15°C; habita regiões rochosas. Espécie carnívora e oportunista. Alimenta-se de peixes (cavala, pescada-branca), cefalópodes (por exemplo, lulas), anfípodes, caranguejos, camarões, moluscos, ctenóforos, equinodermes (por exemplo, pepino-do-mar), poliquetas, anémonas, organismos gelatinosos e algas (vermelhas, verdes e castanhas). Indivíduos mais pequenos (<60 cm de comprimento total) demonstram preferência por crustáceos, sendo os peixes ósseos o alimento principal dos indivíduos maiores. Recém-nascidos podem ser predados por peixes ósseos e tubarões, enquanto os juvenis e adultos poderão ser capturados por espadartes e focas-cinzentas.

Período de desova:	Fecundidade absoluta mínima: 1 ovo
Von Bertalanffy K: 0,12	Fecundidade absoluta máxima: 20 ovos
Idade de maturação: 32 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,07
Longevidade: 75 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: >10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 138°	Nível trófico: 4,50

## Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Sobre-explorado	Vulnerável

Vulnerabilidade às pescas: 64,2