


Lagostim

Nephrops norvegicus

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Moderada
SUL	Moderada	Moderada



Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
8 toneladas/ano	9 toneladas/ano	164 toneladas/ano
Redes de arrasto: 8%	Redes de arrasto: 88%	Redes de arrasto: 95%
Pesca artesanal: 92%	Pesca artesanal: 12%	Pesca artesanal: 5%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

O lagostim pode ser encontrado na plataforma continental e talude continental. Espécie epibêntica e sedentária. Habita fundos lodosos, nos quais se enterra. Animal noturno, que se alimenta de detritos, crustáceos e anelídeos. É um predador ativo e também necrófago.

Período de desova: 4 meses	Fecundidade relativa mínima: 735 ovos / g da fêmea
Von Bertalanffy K: 0,15	Fecundidade relativa máxima:
Idade de maturação: 4 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,52
Longevidade:	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: >10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 39°	Nível trófico: 3,67

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 14,4