

Linguado-legítimo

Solea solea

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
81,8 toneladas/ano	85,8 toneladas/ano	41,4 toneladas/ano
Redes de arrasto: 9%	Redes de arrasto: 1%	Redes de arrasto: 2%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 1%
Pesca artesanal: 91%	Pesca artesanal: 99%	Pesca artesanal: 97%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Geralmente é uma espécie solitária. Este peixe enterra-se em fundos arenosos e lodosos. Migra para águas mais profundas durante o inverno. Os juvenis podem ser encontrados em áreas berçário, em zonas costeiras, nos seus primeiros anos de vida (2 – 3 anos) antes de migrarem para águas mais profundas. Adultos alimentam-se, durante a noite, de poliquetas, moluscos e pequenos crustáceos. A desova é parcial e o recrutamento bastante variável.

Período de desova: 6 meses	Fecundidade absoluta mínima: 100 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,34	Fecundidade absoluta máxima: 150 000 ovos
Idade de maturação: 2,8 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,51
Longevidade: 26,4 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 11°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 50°	Nível trófico: 3,30

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 36,1