

Mexilhão

Mytilus galloprovincialis

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Muito baixa	Muito baixa
CENTRO	Muito baixa	Muito baixa
SUL	Muito baixa	Muito baixa




Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
39,2 toneladas/ano	5,1 toneladas/ano	39,2 toneladas/ano
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Encontra-se no inferior da zona entremarés, fixo a substratos rochosos. Indivíduos de menores dimensões encontram-se no rebordo exterior da colónia. Alimenta-se de fitoplâncton e zooplâncton.

Período de desova: 5 meses	Fecundidade absoluta mínima: 5 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,58	Fecundidade absoluta máxima: 8 000 000 ovos
Idade de maturação: 1 ano	Taxa de crescimento populacional: 0,50
Longevidade: 24 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 12,5°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 31°	Nível trófico: 2,00

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: 10,0