

Pata-roxa

Scyliorhinus canicula

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987b)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
222 toneladas/ano	67 toneladas/ano	106 toneladas/ano
Redes de arrasto: 71%	Redes de arrasto: 43%	Redes de arrasto: 56%
Pesca artesanal: 29%	Pesca artesanal: 57%	Pesca artesanal: 44%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Estudos no sudoeste da Irlanda revelaram que os indivíduos machos deslocam-se de águas mais profundas (12–24 m), durante o dia, para áreas de alimentação em águas superficiais adjacentes (<4 m), durante o crepúsculo, regressando às águas mais profundas ao amanhecer. Não é conhecido por realizar migrações de longa distância.

Período de desova: 6 meses	Fecundidade absoluta mínima: 96 ovos
Von Bertalanffy K: 0,24	Fecundidade absoluta máxima: 115 ovos
Idade de maturação: 3 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,35
Longevidade: 12 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 51°	Nível trófico: 3,67

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 62,2