

Peixe-aranha-maior

Trachinus draco

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987b)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
0,08 toneladas/ano	0,58 toneladas/ano	0,85 toneladas/ano
Redes de arrasto: 76%	Redes de arrasto: 8%	Redes de arrasto: 13%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 24%	Pesca artesanal: 92%	Pesca artesanal: 87%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

A espécie *Trachinus draco* é normalmente encontrada entre os 20 e 50 metros de profundidade, migrando para águas mais profundas no inverno (100 m) podendo mesmo chegar até uma profundidade de 200 m, onde se enterra no substrato. Apresenta um comportamento pelágico durante a noite, sendo mais abundante em águas de salinidade moderada e tendo uma preferência por fundos arenosos. É sugerido que esta espécie seja característica de habitats que sejam diretamente influenciados por pradarias de ervas marinhas, especialmente por *Posidonia oceanica*.

Período de desova: 5 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K:	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação: 1 ano	Taxa de crescimento populacional:
Longevidade: 5,5 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 39°	Nível trófico: 4,18

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 42,3