





# Peixe-espada-branco

*Lepidopus caudatus*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa



## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>74 toneladas/ano</b>	<b>120 toneladas/ano</b>	<b>2 430 toneladas/ano</b>
Pesca artesanal: 99,9%	Pesca artesanal: 99,9%	Pesca artesanal: 99,9%
Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 

## Ecologia geral

Ocorre na plataforma continental, ao longo do seu limite e declive superior até à profundidade de 400 m (600 m na Austrália), habitualmente em fundos arenosos e lodosos entre os 100 e 250 m de profundidade (para além dos 300m na Austrália). Na região oriental do Mar Jónico, esta espécie habita o intervalo de profundidades entre 333 e 620 m. Realiza migrações noturnas para meio da coluna de água. Forma cardumes: é ocasionalmente encontrado em águas costeiras durante o afloramento costeiro de águas mais profundas, aparecendo à superfície. Alimenta-se de crustáceos, pequenas lulas e peixes.

Período de desova: 6 meses	Fecundidade relativa mínima:
Von Bertalanffy K: 0,27	Fecundidade relativa máxima:
Idade de maturação:	Taxa de crescimento populacional: 0,41
Longevidade: 8 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 7°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 113°	Nível trófico: 4,12

## Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Pouco preocupante

**Vulnerabilidade às pescas:** 53,1