

Percebe

Pollicipes pollicipes



Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987a)

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
13 toneladas/ano	5 toneladas/ano	6 toneladas/ano
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Esta espécie habita locais rochosos expostos a elevado hidrodinamismo, situados na zona entremarés. São necessários mais estudos relativos à sua alimentação em habitat natural. Outra espécie do mesmo género – *P. polymerus* – alimenta-se de diatomáceas, detritos, crustáceos pelágicos, fitoplâncton, microalgas, copépodes e poliquetas.

Período de desova: 6 meses	Fecundidade absoluta mínima: 30 000 ovos
Von Bertalanffy K:	Fecundidade absoluta máxima: 130 000 ovos
Idade de maturação: 1 ano	Duração da fase larvar planctónica: 15 dias
Longevidade: 20 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 7,7°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 35°	Nível trófico:

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Não definido

Vulnerabilidade às pescas: Não definido