

# Pregado

*Scophthalmus maximus*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Moderada	Moderada
SUL	Moderada	Moderada




Imagem: fao.org

## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>24 toneladas/ano</b>	<b>11 toneladas/ano</b>	<b>7 toneladas/ano</b>
Redes de arrasto: 31%	Redes de arrasto: 3,3%	Redes de arrasto: 5%
Pesca artesanal: 69%	Pesca artesanal: 96,7%	Pesca artesanal: 95%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

## Ecologia geral

Esta espécie pode ser encontrada em variados habitats, desde pequenos cursos de água a grandes rios e lagos, e também em estuários, lagoas e águas costeiras. Em condições naturais, somente está presente em áreas ligadas ao mar; sendo o recrutamento efetuado noutra local. A estrutura populacional de *Scophthalmus maximus* apenas recentemente foi alvo de atenção por parte das entidades responsáveis pela gestão de pesca. *S. maximus* apresenta baixa dispersão larvar, forte fidelidade ao local de desova e os adultos demonstram ter migração limitada.

Período de desova: 4 meses	Fecundidade relativa mínima: 998 ovos / g da fêmea
Von Bertalanffy K: 0,28	Fecundidade relativa máxima:
Idade de maturação: 3 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,50
Longevidade: 25 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 40°	Nível trófico: 3,96

## Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Vulnerável

Vulnerabilidade às pescas: 42,5