


# Raia-lenga




*Raja clavata*

Imagem: Gervais & Boulart,  
Les Poissons tome 3. Paris:  
J. Rothschild, ca. 1860

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Moderada	Moderada
SUL	Moderada	Moderada



## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>726 toneladas/ano</b>	<b>231 toneladas/ano</b>	<b>285 toneladas/ano</b>
Redes de arrasto: 28%	Redes de arrasto: 22%	Redes de arrasto: 25%
Pesca artesanal: 72%	Pesca artesanal: 78%	Pesca artesanal: 75%
Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 

## Ecologia geral

Predador noturno. Alimenta-se de uma grande variedade de animais bentónicos e demersais. Os poliquetas e os crustáceos são importantes na alimentação de indivíduos mais pequenos, e os peixes ósseos na alimentação dos indivíduos maiores.

Período de desova: 1 mês	Fecundidade absoluta mínima: 52 ovos
Von Bertalanffy K: 0,14	Fecundidade absoluta máxima: 170 ovos
Idade de maturação: 5 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,18
Longevidade: 15 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 99°	Nível trófico: 4,15

## Conservação

<b>Estado do estoque – ICES:</b>	<b>Vulnerabilidade – IUCN:</b>
Desconhecido	Quase ameaçada

Vulnerabilidade às pescas: 72,7