





# Rascasso-escorpião

*Scorpaena notata*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Muito baixa	Muito baixa
CENTRO	Muito baixa	Muito baixa
SUL	Muito baixa	Muito baixa



## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>5 toneladas/ano</b>	<b>6 toneladas/ano</b>	<b>10 toneladas/ano</b>
Redes de arrasto: 7%	Redes de arrasto: 1%	Redes de arrasto: 4%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 93%	Pesca artesanal: 99%	Pesca artesanal: 96%
Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 

## Ecologia geral

O rascasso-escorpião é um peixe noturno que se alimenta de crustáceos e pequenos peixes. A taxa de crescimento do rascasso-escorpião é mais elevada em indivíduos que habitam substratos com maior quantidade de biomassa de algas.

Período de desova: 2 meses	Fecundidade absoluta mínima: 6 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,33	Fecundidade absoluta máxima: 33 000 ovos
Idade de maturação: 1 ano	Taxa de crescimento populacional:
Longevidade: 8 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <5°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 33°	Nível trófico: 3,44

## Conservação

<b>Estado do estoque – ICES:</b>	<b>Vulnerabilidade – IUCN:</b>
Não definido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 27,2