

Robalo-legítimo

Dicentrarchus labrax

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Moderada	Moderada
SUL	Moderada	Moderada




Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
84 toneladas/ano	37 toneladas/ano	37 toneladas/ano
Redes de cerco: 3%	Redes de cerco: 2%	Redes de cerco: 1%
Pesca artesanal: 97%	Pesca artesanal: 98%	Pesca artesanal: 99%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Suporta grandes variações de temperatura (euritérmico). Durante a fase juvenil apresenta comportamento gregário. Predador voraz. Elevada tolerância a mudanças de salinidade. Adultos migram para os estuários no verão, onde desovam entre janeiro e junho. Juvenis habitam águas com 0,24–0,37% de salinidade, onde se alimentam maioritariamente de zooplâncton. A partir de 3cm de comprimento total, a dieta altera-se para anelídeos, crustáceos e larvas de peixe. Adultos são estritamente carnívoros, sobrevivendo de peixes de pequenas e médias dimensões.

Período de desova: 4 meses	Fecundidade absoluta mínima: 230 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,18	Fecundidade absoluta máxima: 800 000 ovos
Idade de maturação: 4 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,54
Longevidade: 30 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: >10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 61°	Nível trófico: 3,47

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 69,1