

Rodvalho

Scophthalmus rhombus

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Muito baixa	Muito baixa
CENTRO	Muito baixa	Muito baixa
SUL	Muito baixa	Muito baixa







Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
27 toneladas/ano	6 toneladas/ano	2 toneladas/ano
Redes de arrasto: 30%	Redes de arrasto: 6%	Redes de arrasto: 5%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 70%	Pesca artesanal: 94%	Pesca artesanal: 95%
Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 

Ecologia geral

Esta espécie habita fundos parcialmente ou totalmente arenosos; alimentando-se de peixes demersais e crustáceos de maiores dimensões; elevado valor económico.

Período de desova: 6 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,50	Duração da fase larvar planctónica: 26 dias
Idade de maturação: 1,5 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,47
Longevidade: 5,8 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 11,1°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 38°	Nível trófico: 4,22

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 31,6