


Salmonete-legítimo

Mullus surmuletus

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa



Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
45 Toneladas/ano	10 Toneladas/ano	58 Toneladas/ano
Redes de arrasto: 58%	Redes de arrasto: 17%	Redes de arrasto: 32%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 2%	Redes de cerco: 1%
Pesca artesanal: 42%	Pesca artesanal: 81%	Pesca artesanal: 67%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Abundante perto da costa, entre os 10 e 100 metros de profundidade. Prefere fundos rochosos, mas também pode ser encontrado em fundos de areia. Varia entre as profundidades de 5 a 400m profundidade. Alimenta-se de organismos bentónicos como anfípodes, camarões, poliquetas, moluscos ou de peixes e outros carnívoros bentónicos que habitam o substrato.

Período de desova: 3 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,32	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação: 1,3 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,85
Longevidade: 11 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 48°	Nível trófico: 3,46

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Exploração sustentável	Dados insuficientes

Vulnerabilidade às pescas: 39,0