

# Sardinha-da-Madeira

*Sardinella maderensis*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Moderada
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: fao.org

## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>0,00 toneladas/ano</b>	<b>0,00 toneladas/ano</b>	<b>0,02 toneladas/ano</b>
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%	Redes de cerco: 0%
Pesca artesanal: 0%	Pesca artesanal: 0%	Pesca artesanal: 100%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

## Ecologia geral

Esta espécie tolera as baixas salinidades presentes em estuários. Os juvenis e adultos demonstram uma clara migração de norte para sul na sua área de distribuição entre Gabão e Angola, assim como entre Mauritânia e Serra Leoa; existindo áreas berçário em cada sector – estas deslocações estão relacionadas com o afloramento costeiro sazonal. Migrações na zona central (Costa do Marfim – Gana) não são tão pronunciadas.

Período de desova: 4,5 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,45	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação:	Taxa de crescimento populacional: 0,57
Longevidade:	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 9,9°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 69°	Nível trófico: 3,20

## Conservação

<b>Estado do estoque – ICES:</b>	<b>Vulnerabilidade – IUCN:</b>
Sobre-explorado	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 32,8