


Sargo-legítimo

Diplodus sargus



VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Moderada	Moderada
CENTRO	Baixa	Moderada
SUL	Moderada	Moderada

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
42 toneladas/ano	18 toneladas/ano	28 toneladas/ano
Redes de arrasto: 19%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 8%	Redes de cerco: 23%	Redes de cerco: 16%
Pesca artesanal: 73%	Pesca artesanal: 77%	Pesca artesanal: 84%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Habita áreas com recifes rochosos e pradarias de *Posidonia oceanica*. Tal como os outros esparídeos, o Sargo-legítimo é muito ativo e frequenta locais de rebentação, sobretudo pela madrugada. É uma espécie diurna omnívora que se alimenta de algas, ouriços-do-mar, anelídeos, gastrópodes e anfípodes. Especificamente nos Açores, tornaram-se em importantes predadores de ouriços-do-mar, em habitats costeiros. Também se alimenta de marisco e de outros invertebrados bentónicos, que consegue recolher do sedimento.

Período de desova: 4,3 meses	Fecundidade absoluta mínima: 64 600 ovos
Von Bertalanffy K: 0,16	Fecundidade absoluta máxima: 536 000 ovos
Idade de maturação: 3,5 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,54
Longevidade: 10 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: <10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 84°	Nível trófico: 3,24

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Dados insuficientes

Vulnerabilidade às pescas: 63,4