

Sarração

Sarda sarda

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Muito baixa	Muito baixa
CENTRO	Muito baixa	Muito baixa
SUL	Muito baixa	Muito baixa



Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
35 toneladas/ano	27 toneladas/ano	63 toneladas/ano
Redes de cerco: 72%	Redes de cerco: 35%	Redes de cerco: 40%
Pesca artesanal: 28%	Pesca artesanal: 65%	Pesca artesanal: 60%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Os juvenis e adultos são conhecidos por serem canibais – os adultos alimentam-se principalmente de pequenos cardumes de peixe, sendo que a escolha das espécies depende da local.

Período de desova: 3 meses	Fecundidade relativa mínima:
Von Bertalanffy K: 0,53	Fecundidade relativa máxima:
Idade de maturação:	Taxa de crescimento populacional: 0,57
Longevidade: 5 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: ~16°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 102°	Nível trófico: 4,34

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Desconhecido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 32,7