





# Tintureira

*Prionace glauca*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa



## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>207 toneladas/ano</b>	<b>4 toneladas/ano</b>	<b>137 toneladas/ano</b>
Pesca artesanal: 99%	Redes de cerco: 10% Pesca artesanal: 90%	Pesca artesanal: 99%
Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 

## Ecologia geral

Este tubarão pode ser encontrado a nível global em mares tropicais e temperados; é uma espécie pelágica, por vezes avistada em águas costeiras. Presente na plataforma continental. Temperatura preferencial entre 7–16°C; sendo encontrado normalmente em águas mais profundas nos trópicos. Espécie carnívora.

Período de desova: 1 mês	Fecundidade absoluta mínima: 4 ovos
Von Bertalanffy K: 0,16	Fecundidade absoluta máxima: 135 ovos
Idade de maturação: 6,5 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,06
Longevidade: 20 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: >10°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 126°	Nível trófico: 4,37

## Conservação

<b>Estado do estoque – ICES:</b>	<b>Vulnerabilidade – IUCN:</b>
Exploração sustentável	Quase ameaçada

Vulnerabilidade às pescas: 76,5