

Trombeiro

Spicara maena

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Muito baixa	Muito baixa
CENTRO	Muito baixa	Muito baixa
SUL	Muito baixa	Muito baixa




Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
0,09 toneladas/ano	1 tonelada/ano	30,2 toneladas/ano
Redes de arrasto: 33%	Redes de arrasto: 1%	Redes de arrasto: 13%
Redes de cerco: 1%	Redes de cerco: 75%	Redes de cerco: 44%
Pesca artesanal: 66%	Pesca artesanal: 24%	Pesca artesanal: 43%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Adultos ocorrem na zona nerítica, normalmente sobre pradarias marinhas (compostas pelo género *Posidonia*) e em fundos arenosos ou lodosos. Distribuem-se entre os 30 e 90 m de profundidade. Alimentam-se de zooplâncton. É uma espécie hermafrodita do tipo protogínico.

Período de desova: 3,5 meses	Fecundidade absoluta mínima: 16 750 ovos
Von Bertalanffy K: 0,30	Fecundidade absoluta máxima: 28 125 ovos
Idade de maturação: 2 anos	Taxa de crescimento populacional: 1,01
Longevidade: 8 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 5,1°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 19°	Nível trófico: 4,15

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 45,4