

Trombeteiro

Macroramphosus scolopax

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Muito baixa	Muito baixa
CENTRO	Muito baixa	Muito baixa
SUL	Muito baixa	Muito baixa




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987b)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
0,21 toneladas/ano	0,06 toneladas/ano	0,05 toneladas/ano
Redes de arrasto: 1%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 93%	Redes de cerco: 26%	Redes de cerco: 81%
Pesca artesanal: 6%	Pesca artesanal: 74%	Pesca artesanal: 19%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Esta espécie pode ser encontrada na plataforma e talude continental. Habita substratos arenosos ou lodosos, entre os 20 e 150 m de profundidade. Espécie que forma cardumes.

Período de desova: 2 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,41	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação:	Duração da fase larvar planctónica:
Longevidade:	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 16,2°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 109°	Nível trófico: 3,47

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 26,6