

Verdinho

Micromesistius poutassou

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa







Imagem: fao.org

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
1 463 toneladas/ano	395 toneladas/ano	473 toneladas/ano
Redes de arrasto: 98%	Redes de arrasto: 88%	Redes de arrasto: 85%
Redes de cerco: 1%	Pesca artesanal: 12%	Pesca artesanal: 15%
Pesca artesanal: 1%		
Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 	Tendência em 20 anos: 

Ecologia geral

O verdinho pode ser encontrado na plataforma e no talude continental até mais de 1 000 m de profundidade, sendo mais comum entre os 300–400 m. Alimenta-se sobretudo de pequenos crustáceos, mas os indivíduos maiores também capturam pequenos peixes e cefalópodes. Efetua migrações verticais diárias; encontra-se em águas superficiais durante a noite e permanece no fundo durante o dia.

Período de desova: 4 meses	Fecundidade absoluta mínima: 6 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,32	Fecundidade absoluta máxima: 15 000 ovos
Idade de maturação: 3 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,47
Longevidade: 20 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: >15°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 53°	Nível trófico: 3,70

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Exploração sustentável	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 33,6