

Xaputa

Brama brama

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Baixa
SUL	Baixa	Baixa




Imagem: Fischer, Schneider, Bauchot (1987b)

Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
33 toneladas/ano	8 toneladas/ano	95 toneladas/ano
Redes de arrasto: 2%	Redes de arrasto: 2%	Pesca artesanal: 99.9%
Pesca artesanal: 98%	Pesca artesanal: 98%	
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

Ecologia geral

Espécie oceânica e epipelágica, mas que também pode ser encontrada a 1 000 m de profundidade. Aproxima-se ocasionalmente da costa. Migrador sazonal, podendo formar pequenos cardumes – aparentemente estas deslocções estão relacionadas com a temperatura. Espécie oportunista, alimentando-se de pequenos peixes, cefalópodes, anfípodes e eufasiáceos. Este peixe é vendido tanto fresco, como congelado;

Período de desova: 2 meses	Fecundidade absoluta mínima:
Von Bertalanffy K: 0,08	Fecundidade absoluta máxima:
Idade de maturação:	Taxa de crescimento populacional:
Longevidade: 25 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: >15°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 136°	Nível trófico: 4,08

Conservação

Estado do estoque – ICES:	Vulnerabilidade – IUCN:
Não definido	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 70,7